

# 豊郷町子どもの定期予防接種一覧表（令和8年4月1日現在）

予防接種		対象期間	回数	接種間隔	望ましい時期
小児の肺炎球菌感染症		生後2カ月から60カ月に至るまで	初回：3回	【標準スケジュール】 初回：27日以上の間隔を置いて、標準的には生後12カ月に達するまでに3回接種	初回：生後2カ月から生後7カ月まで
			追加：1回	追加：初回（3回）接種終了後60日以上の間隔を置いて1歳以降に1回接種	追加：生後12カ月から生後15カ月
ヒブ感染症（Hib） （※五種混合を受ける場合は、不要）		生後2カ月から60カ月に至るまで	初回：3回	【標準スケジュール】 初回：27日以上（標準的には27日から56日までの間隔）の間隔を置いて生後7か月に達するまでに3回接種	初回：生後2カ月から生後7カ月まで
			追加：1回	追加：初回（3回）接種終了後7カ月以上の間隔を置いて（標準的には7カ月から13カ月までの間隔）1回接種	追加：初回接種終了後7カ月から13カ月までの間隔をおく
B型肝炎		1歳に至るまで	3回	27日以上の間隔を置いて2回接種した後、1回目接種日から139日以上の間隔で1回接種	生後2カ月から9カ月に達するまで
ロタウイルス感染症		出生6週0日後から24週0日後まで	2回	ロタリックス 初回接種から27日以上の間隔を置いて	生後2カ月に至った日から出生14週6日後まで
		出生6週0日後から32週0日後まで	3回	ロタテック 初回接種から27日以上の間隔を置いて	
五種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・Hib）	1期初回	生後2カ月から90カ月に至るまで	3回	20日以上の間隔を置いて（標準的には20日から56日までの間隔）	生後2カ月から7カ月に至るまでに開始
	1期追加		1回	初回（3回）接種終了後6カ月以上の間隔を置いて	初回（3回）終了後6カ月から18カ月までの間隔をおく
二種混合（ジフテリア・破傷風）		11歳以上13歳未満	1回	—	11歳
BCG（結核）		1歳に至るまで	1回	—	生後5カ月から8カ月に達するまで
麻しん風しん混合（MR）	1期	生後12カ月から24カ月に至るまで	1回	—	—
	2期	小学校就学前1年間	1回	—	—
水痘		生後12カ月から36カ月に至るまで	2回	初回接種終了後3カ月以上の間隔を置いて（標準的には6カ月から1年までの間隔）	生後12カ月から15カ月に達するまでに初回接種
日本脳炎	1期初回	生後6カ月から90カ月に至るまで	2回	6日以上の間隔を置いて（標準的には6日から28日までの間隔）	3歳
	1期追加		1回	1期初回（2回）終了後6カ月以上の間隔を置いて（標準的にはおおむね1年）	4歳
	2期	9歳以上13歳未満	1回	—	9歳
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）		小学校6年生から高校1年生相当の年齢の女子	3回	標準的な接種間隔  【9価 シルガード】 2回目：1回目の接種から2カ月の間隔をおく 3回目：1回目の接種から6カ月の間隔をおく	中学校1年生 *9価ワクチンの場合、初回接種が15歳未満であれば、6カ月の間隔を置いて2回の接種で完了することができます。